



## **VIANO BIO PIROSBOGYÓS NÖVÉNYTÁP 6-5-10 +4MgO**

### **Specifikáció :**

Adagolás : 50-150g/m<sup>2</sup> , a talaj minőségének függvényében  
 Kiszerezések : 0,75kg és 1,75kg  
 Gyűjtő: 16x0,75kg/karton, 8x1,75kg/karton  
 Szemcse méret: RC granulátum  
 Felhasználási időszak: : J F **M A M J J A S O** N D

### **Termék ismertetés:**

komplex szerves növénytáp kieserittel dúsítva , szamócák- és egyéb piros bogyós gyümölcsök (szeder, málna, piszke, feketeáfonya, ribizli, stb) tápanyagellátásához. Magas kálium, magnézium tartalom biztosítja a növények bőséges virágzását és a zamatos, hosszan eltartható termést. Használatával garantált a bogyós gyümölcsök gazdag íz világa. A szerves táp ültetésnél, illetve a növekedési szakaszban tápanyag utánpótlásra egyaránt használható. Ajánlott a talajok őszi tápanyag utánpótlásának kezelésére is. A tápanyagot lehetőség szerint keverjük össze a talajjal és öntözzük be. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása **100 napon** át garantált. **A TERMÉK TÜV NORD BIO, NÉBIH ÖKO MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZIK. BIO GAZDÁLKODÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ.**

### **Hatóanyag tartalom:**

N (m/m %) sz.a. 6,0 +/- 0,4  
 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (m/m %) sz.a. 5,0 +/- 0,4  
 K<sub>2</sub>O (m/m %) sz.a. 10,0 +/- 0,4  
 MgO (m/m %) sz.a. 4,0 +/- 0,4.  
 szervesanyag tartalom legalább 45%,  
 pH 7,1 +/-0,5.



### **Felhasználás & adagolás:**

TAVASZ	ÜLTETÉS	FENNTARTÁS	KONTÉNERES NÖV	PREFERED TEMP.
Szamóca	50g/növény	150g/ m <sup>2</sup> minden 2 hónapban	5-10g/1L talaj	12-15°C
pirosbogyós gyümölcsök	50g/növény	150g/ m <sup>2</sup> minden 2 hónapban	5-10g/1L talaj	12-15°C

### **Fizikai jellemzők :**

- egyszerű felhasználás – granulált termék – higiénikus használat
- kijuttatható kézzel vagy bármilyen centrifugális műtrágyaszóró berendezéssel
- sűrűség cca. 0,8kg / dm<sup>3</sup>
- MSDS elérhető igény szerint
- tipp: 1 marék tápanyag = cca 50 gramm

Forgalomba hozatali engedély száma: 04.02/1753-1/2016 **Érvényessége:** 2026.03.18